



ANWENDUNG RELIEF ACP GEL:

1.

Starten Sie mit dem Auftragen des Relief Gels 1-2 Tage vor Ihrer Bleaching Behandlung.
Drehen Sie den Verschluss im 90 Grad Winkel von der Kanüle ab.

Setzen Sie dann den Verschluss mit der Spirale auf die Kanüle und drehen Sie diesen
im 90 Grad Winkel auf.

Entfernen Sie dann die kleine, graue Verschlusskappe.

2.

Drücken Sie eine ca. erbsengroße Menge Gel heraus und tragen Sie diese mit Ihrem Finger
auf die Außenflächen Ihrer Zähne, speziell Zahnhäse auf.

Nach der Anwendung von Relief ACP Gel sollten Sie 30 Minuten nicht essen, nicht trinken
und nicht rauchen.

3.

Wiederholen Sie den Vorgang ca. 1-2 mal täglich.

4.

Patienten mit extrem empfindlichen Zähnen und Zahnhäsen wird empfohlen, bereits eine
Woche vor der Zahnaufhellung zweimal täglich das Relief ACP Oral Care Gel anzuwenden.

5.

Ein Verschlucken des Gels ist nicht gesundheitsschädlich.

Das Geheimnis der Wirksamkeit von Relief ACP liegt in der einzigartigen

Zusammensetzung:

50 mg Kaliumnitrat

3,75 mg Tricalciumphosphat